

Protocolo de Tratamiento Local de Enfermedades Venéreas en Toros (Experimental)

Código: IPR-071
Revisión: 0
Vigencia: 24/06/25
Emitido: ET
Página 1 de 2

Protocolo de tratamiento local con Isometamidium en toros naturalmente infectados con *Tritrichomona foetus*

MATERIALES

1. Solución Fisiológica.
2. Jeringas x 50 ml.
3. Sondas ó cánulas de plástico.
4. Isomet (Over). Cada frasco con polvo contiene: Cloruro de isometamidium clorhidrato 4 g
Cada frasco con solvente contiene: Solución estéril 200 ml.

TECNICA DE LAVAJE PREPUCIAL

1. Colocar 40 ml de solución recién preparada de Isomet (Over) en 250 ml de solución fisiológica.
2. Tratar que un ayudante empuje el pene desde atrás por encima del escroto (presión sobre la flexura sigmoidea o S del pene).
3. Colocar dicha solución dentro del prepucio comenzando de atrás hacia adelante a través de una sonda o una pajuela.
4. Luego de llenar muy bien el espacio prepucial, mantener cerrado el orificio y masajear suavemente durante 5 minutos todo el prepucio en toda su extensión a los efectos que la solución penetre en los pliegues (criptas) de la mucosa prepucial y disuelva todo el esmegma presente. (en dicho lugar se aloja la trichomona).
5. Vaciar el prepucio sin lavaje posterior.

CONTROL POSTERIOR AL TRATAMIENTO

1. Hacer control por raspaje a los 15 y a los 30 días posteriores al tratamiento mediante la técnica de cultivo y PCR.

Protocolo de Tratamiento Local de Enfermedades Venéreas en Toros (Experimental)

Código: IPR-071
Revisión: 0
Vigencia: 24/06/25
Emitido: ET
Página 2 de 2

Protocolo de tratamiento local con Oxitetraciclina en toros naturalmente infectados con *Campylobacter foetus*

MATERIALES

1. Solución Fisiológica.
2. Jeringas x 50 ml.
3. Sondas ó cánulas de plástico.
4. Clorhidrato de Oxitetraciclina al 5 %. .

TECNICA DE LAVAJE PREPUCIAL

1. Colocar 50 ml de Clorhidrato de Oxitetraciclina al 5 % en 250 ml de solución fisiológica.
2. Tratar que un ayudante empuje el pene desde atrás por encima del escroto (presión sobre la flexura sigmoidea o S del pene).
3. Colocar dicha solución dentro del prepucio comenzando de atrás hacia adelante a través de una sonda o una pajuela.
4. Luego de llenar muy bien el espacio prepucial, mantener cerrado el orificio y masajear suavemente durante 5 minutos todo el prepucio en toda su extensión a los efectos que la solución penetre en los pliegues (criptas) de la mucosa prepucial y disuelva todo el esmegma presente. (en dicho lugar se aloja el *Campylobacter*).
5. Vaciar el prepucio sin lavaje posterior.

CONTROL POSTERIOR AL TRATAMIENTO

1. Hacer control por raspaje a los 15 y a los 30 días posteriores al tratamiento mediante la técnica de Inmunofluorescencia directa y PCR.